



Desox-sil

****EXCLUSIVIDADE Herva'S Pineda****

Apresentação:

Ampola(Desoxicolato de sódio 4,75%+ Silício3% – 2ml USO: SC



PINEDA
Laboratório de Injetáveis
Grupo HERVAS

Caminho da Longevidade

PROPRIEDADES

Associação dos ativos Desoxicolato e Silício com ação lipolítica mais eficaz. A associação destes dois ativos potencializa a ação lipolítica. Ação emulsificante de gorduras, drenante e reestruturante da flacidez com diminuição da dor local.

Em relação a aplicação somente do Desoxicolato, o Desox-Sil, devido sua associação, causa menos edema e nodulação.

MECANISMO DE AÇÃO

Emulsificante de gorduras, redução de grandes panículos. Diminuição da gordura local e flacidez. O Silício atua no aumento do tônus e elasticidade da pele; atua como lipolítico, drenante e anti-inflamatório. Quando se refere a gordura localizada, o desoxicolato de sódio é tóxico para o tecido adiposo, causando a lise dos adipócitos e a remoção permanente do mesmo e traz bons resultados no combate da gordura localizada. Sais de bile como desoxicolato, é um conhecido detergente e vêm sendo usado por décadas na medicina estética devido suas propriedades químicas polares e não polares únicas que facilitam a emulsificação de substâncias insolúveis por meio da redução da tensão superficial nas suas interfaces. Atua como um detergente que quebra e dissolve membranas celulares do adipócito.

Preparo:

Observar o pH descrito em cada ampola e aspirar o conteúdo na seringa de forma crescente evitando assim a precipitação dos princípios ativos e futuros desconfortos para o paciente

APLICAÇÃO

- Seringa de 20mL para diluir os ativos
- Agulha 18G ½ (1,2x40mm) para aspirar o conteúdo das ampolas
- Seringa de 3mL ou outra de volume maior, em caso de mesclas associadas para aplicação no tecido
- Agulha 30G ½ (0,3x13mm) para aplicação no tecido
- Aplicação EXCLUSIVAMENTE SUBCUTÂNEA
- Dividir a região a ser aplicada a partir de um lápis branco para identificar no momento da aplicação quais locais foram aplicados e quais não, da seguinte forma, se a região escolhida for a região abdominal, por exemplo, é indicado dividir até 50 pontos, sempre distanciando do umbigo e dividindo por exemplo 25 pontos do lado direito e 25 pontos do lado esquerdo, no momento da aplicação é indicado respeitar
- Aplicar em ângulo de 90°, no volume máximo por ponto de 0,1mL até 0,15mL distanciando-os de 1,5 a 2 cm² de área de um ponto a outro.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

- Aplicação deve ser feita DIRETAMENTE no TECIDO SUBCUTÂNEO
- Panículo adiposo de no MÍNIMO 4cm de espessura, lembrando que a partir da diminuição do panículo é recomendável a troca de tratamento, trabalhando com lipolíticos mais brandos
- REAÇÕES ESPERADAS: Eritema imediato, ardor, calor e dor no local da aplicação, edema e nodulação em todos os pontos aplicados, lembrando que os edemas e as nodulações desaparecem em aproximadamente uma semana ou no máximo dependendo de alguns casos estender-se por até 15 dias.
Recomenda-se aplicação de gelo por um período de 5 a no máximo 10 minutos para aliviar a dor do paciente .
No dia da aplicação, poderá ser indicado em pacientes muito sensíveis a dor, o uso de um analgésico leve. Em casos de reações inflamatórias muito intensas, pode ser associado o uso de um gel pós-mesoterapia ou corticóide tópico. Para evitar a instalação de processo inflamatório intenso, além das observações já citadas, recomenda-se fazer uma boa diluição da mescla com soro fisiológico ou outros ativos lipolíticos, venolinfocinéticos e anestésicos.

RECOMENDAÇÕES

- ✓ Drenagem linfática somente após 48 horas após o procedimento (para auxiliar na redução do edema e nodulações presentes);
- ✓ Exercícios físicos ou plataforma vibratória somente após 12h do procedimento;
- ✓ Alimentação hipocalórica livre de gorduras durante o tratamento;
- ✓ Alimentar-se no máximo 30 minutos antes do procedimento e após 3 a 4 horas depois.

ASSOCIAÇÕES

- ✓ Ultrassom de alta potencia ANTES
- ✓ Radiofrequência ANTES
- ✓ Lipocavitação ANTES

EM SEGUIDA PODE REALIZAR A INTRADERMOTERAPIA

Indicações de uso

Quebra da gordura localizada, drenante e auxiliar na flacidez.

Sugestões de Mesclas

GORDURA LOCALIZADA / SUBCUTÂNEA

Desox-Sil.....1 amp 2ml
Benzopirona 10mg1 amp 2ml
Baicalina 5mg.....1 amp 1ml
Cafeína 100mg.....1 amp 2ml
Lidocaína 2%.....1 amp 2ml

Aplicar SC 1x cada 15 dias, devido ao desconforto, podendo ser aplicado semanal caso o paciente não apresente desconforto

+

Ubiquinol 40mg.....1 amp 1ml - Aplicar IM 1x/semana
Vitamina D3/A 600.000UI -60.000UI.....1 amp 1ml - Aplicar IM 1x/semana, repetir após 15 dias e após, manter, 1x a cada 90 a 120 dias. *Aplicação de Vit D inicial com avaliação de exames laboratoriais.

LIPODISTROFIA DE GRANDES PANÍCULOS

Desox-Sil.....1 amp 2ml
Asiaticosídeo 0,04%..1 amp 2ml
Tripeptídeo 41 Plus.....1 amp 2ml
Cafeína 100mg.....1 amp 2ml
Lidocaína 2%.....1 amp 2ml

Aplicar SC 1x cada 15 dias, devido ao desconforto, podendo ser aplicado semanal caso o paciente não apresente desconforto

+

Ubiquinol 40mg.....1 amp 1ml - Aplicar IM 1x/semana
Vitamina D3/A 600.000UI -60.000UI.....1 amp 1ml - Aplicar IM 1x/semana, repetir após 15 dias e após, manter, 1x a cada 90 a 120 dias. *Aplicação de Vit D inicial com avaliação de exames laboratoriais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- 1.Moura, J.G.P. O uso racional de nutrientes, minerais, vitaminas e aminoácidos. 4ª Edição. Nutrientes &Terapeutica. Pelotas , 2015 278p.
- 2.Literaturas e Informes técnicos dos fornecedores
- 3.A. Dalloz-Bourguignon. VadeMecum de mesotherapie. Editeur maloine. 1987
- 4.J. Le Cozet al. M'ésotherapie et medicine esthétique, Editeur Sola. 1994
- 5.A. Dalloz-Bourguignon. Mesotepaia uma terapêutica diferente. Editora Andrei. 1988
- 6.Tratado de Mesoterapia, Ignácio Ordiz Garcia. Editora Alicante, 1992
- 7.Atualização Terapêutica e Fisiopatogênica da Lipodistrofia Ginóide, Hugo Ciporkin e Luiz H. Paschoal. Editora Santos. 1992
- 8.UnDéfiThérapeutique: La Mésotherapie. M. Pistor. Maloine A. A. Editeur. 3ª edição, 1986.